

四庫全書

經部

欽定四庫全書

子部

醫壘元戎卷三

詳校官太醫院八品吏目<sub>臣</sub>黃發

編修<sub>臣</sub>倉聖脈覆勘

總校官編修<sub>臣</sub>

王燕緒

校對官修撰<sub>臣</sub>

吳錫齡

膳錄監生<sub>臣</sub>

范楹

欽定四庫全書

醫壘元戎卷三

元 王好古 撰

陽明證 先足經從湯液 次手經從襍例

仲景白虎湯

治身熱頭痛鼻乾不得臥尺寸脉俱浮而長又治傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒非寒冷之寒寒邪之寒熱也

石膏

錢四

甘草

錢半

知母

半

錢

粳米

分

右麤末每服五錢七水一盞半米熟去滓溫服

白虎加人參湯

治動而傷暑大渴

白虎加蒼朮湯

治靜而傷暑不渴

白虎加桂湯

治中暑自汗微惡寒

白虎加梔子湯

治小便淋而煩

白虎加五味湯

治嗽而少津液

竹葉石膏湯

治傷寒解後虛羸少氣逆欲吐

石膏

錢二

人參

錢半

粳米

粒百

半夏

半

錢

甘草

字一

竹葉

片五

麥門冬

錢一

錢

右為麤末每服五錢匕水一盞煎至米熟溫服

張仲景炙甘草湯

本方在太陽門傷寒類要甘草一物湯後

此本太陽證當列於太陽條下胞者肺之府也故入

陽明例

活人五味子湯

治傷寒喘促脉伏而厥

人參

三錢半

五味子

兩半

陳皮

二錢半  
去白

杏仁

二錢半

生薑

二錢半

棗

三枚

麥門冬

去心二錢半

右判如麻豆大水二盞半煎至一盞去滓分二服熬

猪肚湯 益氣之源以消陰翳則便溺有節羊肉冬

瓜湯 膏痺飲水洩多 腎氣丸 胃熱消穀善食

而瘦 地黃丸

消渴手太陽不止消中足陽明 消腎足少陰痺成消

中而數少便 內化丹 麥門冬湯

易老順氣散小承氣湯也 鳳髓丹 化水丹

壯水之主以制陽光則渴飲不思

仲景諸瀉心等湯 手少陰也以其心下痞故入陽明  
例又況服梔子黃芩黃連黃蘗大黃為上經之劑安  
得不例陽明乎

大黃黃連瀉心湯

治太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表  
裏俱虛陰陽血氣并竭無陽則陰毒復加燒針因胞

煩面青黃膚<sub>潤</sub>者難治若色微黃手足溫者易愈心  
下痞按之濡其脉關上浮者

大黃

<sub>二兩</sub>

黃連

<sub>一兩</sub>

加黃芩為伊尹三黃湯

右二味剉如麻豆沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫  
再服

附子瀉心湯

治心下痞而復惡寒汗出本以下之故心下痞與瀉  
心湯痞不解其人瀉而口燥煩小便不利者五苓散



主之

大黃

黃連

黃芩

附子

生薑瀉心湯

治傷寒汗出解之後胃中不和心下痞硬乾噫食臭  
脅下水氣腹內雷鳴下利者此湯主之

生薑

二兩

甘草

黃芩

人參

各一兩半

半夏

三兩

乾薑

半兩

黃連

半兩

棗

六枚

右八味以水五升煮取三升去滓再煎取一升半溫

服半升

易老門冬飲子一名生脉散

治老弱虛人太渴

人參

二錢

五味子

半兩

麥門冬

去心半兩

枸杞

三錢

甘草

三錢炙

白茯苓

二錢去皮

右咬咀生薑水煎此藥與內化丹相表裏手太陰足少陰子母上下經也

王朝奉錄千金方 此方本意出竹葉石膏湯例以此

知仲景羣方之祖也 治勞復能起死人氣欲絕者

煮之有效用麥門冬湯

麥門冬湯

麥門冬

一兩

甘草

炙二兩

粳米

半合

右麥門冬去心為細末水二盞煎粳米令熟去米約得湯一小盞半入藥五錢匕棗二枚去核新竹葉十五片同煎至一盞去滓大溫服不能服者綿滴口中後人治小兒不能灌去者宜用之綿滴法此方不用石膏以其三焦無大熱也兼自欲死之人陽氣將

絕也故不用石膏若加人參尤妙

玉露散

寒水石

半兩

石膏

半兩

甘草

二錢半  
生半炙

右為細末湯調服

外臺蒸病一曰骨蒸二曰脉蒸三曰皮蒸四曰肉蒸五  
曰內蒸各隨藏主又二十三蒸各應見湯液主之盡  
矣五曰內蒸所以言內者必外寒熱把手附骨而  
熱也其根在五臟六腑之中心

因病後得之骨肉自消飲食無味或皮毛燥而無光澤  
蒸極之時四肢漸細足腫趺起石膏十兩碾如乳粉  
法水和服方寸七日再以體涼為度

類要治膏瘡飲少小便多

秦椒

一分  
出

瓜蒂

二分  
末

右水調服方寸七日三服此方服之令人多吐宜約  
量多少不可太過一升分三

伊尹甘草瀉心湯

治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行米穀不  
化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不得安醫見  
心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以  
胃中虛客氣上逆故便硬也宜此湯主之

甘草二

兩

半夏一

兩

黃芩

乾薑

各三

兩半

黃連

半兩

人參

半兩

棗

六枚

右七味以水五升煮取三升去滓再煎取一升半溫  
服半升分三服伊尹湯液此湯也七味今監本無人

參脫落之也伊尹三黃湯無黃芩亦後人脫落之也

半夏瀉心湯

治下利而不痛者為痞也痛即為結胞

半夏

一兩一錢半

黃芩

人參

甘草

炙兩半

乾薑

一兩半

黃連

半兩

大棗

六枚

右水五升煮取三升去滓再煎一升半溫服半升分

三

錢氏瀉心湯一物

易老亦用一物瀉心湯導赤散瀉

丙 瀉心湯瀉丁

導赤散

生地黃

木通

甘草

竹葉

等分

右㕮咀水煎去滓服一法去甘草加黃芩為火府用  
煉蜜為丸彈子大細爵竹葉湯下

一物瀉心湯

張子脩先生為泄斑湯其法見斑論改誤

伊尹三黃湯錢氏改為九治吐血黃疸



活人黃連解毒湯四味無大黃亦得與四物湯相合  
為各半湯 守真為既濟解毒丸

活人解毒四味 海藏加防風連翹為五黃丸亦合  
防風金華丸治風熱 加柴胡治小兒潮熱 加葛  
根治酒毒加蘆薈青黛為衣治小兒肝熱并痞熱食  
塗上脚面黃腹大而足細久則不治

仲景茵陳蒿大黃湯

治濕熱發黃

茵陳蒿六 大黃三 梔子二

梔子蘘皮湯二物

治燥熱發黃

文潞公藥準

仲景茵陳蒿大黃湯治發黃大便自利不止者加黃連  
黃柏各三兩今加大黃用之多效 梔子蘘皮湯加  
大黃黃連活人合而用之改名解毒湯仲景本方無  
黃芩今議方復有黃芩 活人用之伊尹湯液大黃

黃芩并脫落之也 文潞公連藥二物湯治黃有神  
寒熱者加小柴胡湯

李思訓論義

發黃有陰陽然當猶為未也云陽者大渴而不與水炎  
熱而不通風是也云陽黃者鮮之原藥過劑施之而  
遂寇陽和既言此二句當時本無陰候但言黃證皆  
陽壞而成陰不必直指有陰證故治黃茵陳蒿為君  
佐以大黃梔子之屬是也若太陰有黃不必茵陳蒿

內用乾薑只用理中溫藥足矣既有茵陳蒿乾薑湯則知熱證壞而成陰也學者要窮其源故大病主藥內加熱以溫之也謂如桂枝加芍藥桂枝加大黃皆於本藥外所可宜者加之也

大黃黃連瀉心湯 文潞公金匱要略為三黃丸  
錢氏改為三黃湯去黃芩為二聖丸二味等分細末  
豬膽湯煮熟如菴豆大每服十九米飲下

香連丸治泄利 橘連丸疳瘦膽煮粟米粥為丸

襍病發黃痺虛也黃久不去者有積也補脾磨積  
則可不可用涼瀉之藥

活人酒煮黃連丸

治暑毒伏深久不差無藥可治大渴者宜此右黃連  
四兩無灰酒浸上一寸以重湯熬乾碾為細末糊丸  
菴豆大熱水下三十丸胞中清涼不渴為愈 肘後  
治黃疸醫所不能治水芡汁頓飲一小升平旦服食  
後須微汗小便出愈不爾再服

紅九子

治大人脾積氣滯胞膈滿悶面黃腹脹四肢無力酒  
積不食乾嘔不止脾連心胞及兩乳痛婦人脾血積  
氣諸般血癥氣死及小兒食積骨瘦面黃肚脹氣急  
不嗜飲食漸或脾勞不拘老少並宜服之

京三稜

三斤水浸令  
軟切作片字

蓬莪朮

五斤

陳皮

五斤  
揀淨

胡椒

三斤

青皮

五斤

乾薑

三斤  
炮

右六味同為細末醋糊為丸桐子大 紅為衣每服

三十九食後薑湯吞下小兒臨時加減服之

易簡紅九子

脩合治劑之法並見前方

三稜

蓬朮

陳皮

青皮

胡椒

乾薑

阿魏

礬紅

右每服六十九薑湯送下大治大人小兒脾胃等患  
用極有神效 但三稜蓬朮本能破癥消癖其性猛  
烈人不以此為常服之劑然今之所用者以出產之  
處隔絕二藥不得其真乃以紅蒲根之類代之性雖

相近而功力不同年老虛人小兒姪婦以其治病不能傷耗真氣但服之無疑 此藥須是脩合令精細用好米醋煮陳米粉為丸若自脩合之時當去阿魏礬紅名小橘皮煎尋常飲食所傷中脘痞滿服之應手而愈 大病之後穀食難化及治中脘停酸並用薑湯下 脾寒瘧疾生薑橘皮湯下 酒疸穀疸遍身皆黃大麥湯下 兩脇引乳作痛沉香湯下 脾食積面黃腹脹時或乾嘔煨薑湯下 婦人脾血作



痛及血癥氣瘕並經血不調或過而不來並用醋湯  
下寒熱往來者尤宜服之產後狀如癲癇者此  
乃敗血上攻迷亂心神所致當以此藥用熱醋湯下  
其效尤速男子婦人有癲癇之患者未必皆由心  
經蓄熱者亦因脾氣不舒遂致痰飲上迷心竅故成  
斯疾若服涼藥過多則昏亂益甚當以此藥用辰砂  
為衣以橘皮煎湯下名小鎮心丸婦人惡吐嘔逆全  
不納食諸藥不效惟此最妙仍佐以二陳湯服之疑

其隨胎必不信服每每易名用之特有奇功然恐妊婦服之後偶爾傷動必歸咎於此藥故不敢極言其妙 痰迷者紅丸子 心熱者妙香丸 小便不利煩躁喘渴加茯苓猪苓滑石當歸官桂 躁煩喘嘔不渴加陳皮白朮半夏生薑茯苓 四肢遍身冷加附子甘草

茵陳蒿治肢體逆冷腰上自汗加

附子

乾薑

甘草

茵陳附子湯末已其脉上加 吳茱萸 附子

乾薑

木通

當歸

韓氏立名雖曰茵陳茯苓湯茵陳橘皮湯小茵陳湯茵陳四逆湯茵陳附子湯茵陳茱萸湯大抵只是仲景治陰證加茵陳也用者要當識之此證言是溫熱與寒濕故入陽明例謂關天五之氣也

丹砂丸

勞復後目中及徧身黃

丹砂

馬牙硝

麥門冬

犀角

牛黃

金箔

右治下後不任承氣者宜丹砂九膩粉一錢下之用  
砂糖輕粉新汲水調下煩躁病源云陰少陽勝也陰  
病亦有煩躁病少陰病吐利煩躁四逆者死結  
胞證有煩躁者死大青龍亦有煩躁而也金  
匱竹皮大丸主虛煩佳又茯苓散猪苓湯並主煩  
躁少陰病吐利手足逆冷煩躁茯苓四逆湯發  
汗吐下後復煩不解者茯苓四逆湯少陰病吐

利手足逆冷煩 欲死者吳茱萸湯 又八正散治

煩 佳

仲景梔子豉湯

治懊憹煩  
燥不得眠

梔子

四箇

豉

半兩

右水二盞煎梔子至一盞入豉煎至七分溫服得快  
止後服 一法加甘草三錢半本非吐藥以燥濕鬱  
甚以此攻之不能開通則反吐因吐則發泄鬱結之  
氣及行津液而血氣宣行若少氣加甘草以其邪在

上焦而不受藥故吐之 梔子甘草豉湯 嘔者加

生薑三錢

梔子厚朴湯

治傷寒下後心腹脹滿起卧不安

梔子

四兩

厚朴

一兩

枳實

一枚

生薑

水煎

梔子乾薑湯

治陰黃傷寒醫以九藥下之身熱不去微煩

梔子

四枚

乾薑

半兩

右水煎服

已上五法皆汗下吐後用之以邪氣陷於脘中居氣

高之分故隨證加減用之經曰其高者因而越之

活人薤白湯

治下利  
如爛汁

梔子

豉

薤白

右剉先煮梔子次下薤白次豉水三升煮取一升  
散 此藥陽明兼少陽氣中之血藥

梔子

大黃

芒硝

黃芩

薄荷

各半兩

桔梗

甘草

各一兩

連翹

七錢半

右以咀每服五七錢水煎服臨臥時服加生薑亦可

若泄之劑下行居膈中鐵渡江非舟楫不能載此藥  
大概治左寸沉實而可下者本方無桔梗一法加防  
風 治肺金邪熱嗽有痰者加半夏 易老減大黃  
硝解傷寒襍病六經中熱涼膈與四物湯各半服能  
益血泄熱一名雙和散

文潞公藥準註李琬方

山梔子 防風 連翹 柴胡 甘草

活人梔子連翹防風甘草湯兼少陽 錢氏去連翹加



藿香石膏為瀉黃散 內經云諸氣憤鬱皆屬肺金  
凡人有此疾不可不用薄荷故劉禹錫用此藥以治  
憤氣發腫利關節也 易老涼膈散去大黃硝治六  
經中熱說得極有理何以知陳士良云柴胡能引諸  
藥入榮衛療陰陽毒傷寒頭痛四季宜服 又云柴  
胡主風氣壅併攻胞膈當茶食之以此知易老之言  
有自來矣

薄荷例 此藥手太陰兼厥陰故入陽明例

薄荷例

主療并見局方今用御藥院料例

薄荷葉

半斤

甘草

一兩

防風

三錢

縮砂仁

三錢

桔梗

一兩半

芎

七錢半

御藥院蜜料藥一斤蜜三斤煨開便和去砂仁加

薑羌活荆芥甘菊大黃白芷人參為八風丹朱砂為

衣

局方川芎丸

川芎

七錢半

細辛

半錢

防風

二錢半

薄荷

七錢半

桔梗

一兩

甘草

右細末煉蜜丸一兩半分作五十九丸嚼一九茶清下

食後 一法川芎九如枳殼除熱痰嗽 去桔梗加

荊芥白殭蠶天麻羌活白附子川烏頭全蝎 名為

不換金丹硃砂為衣

防風丸

防風

川芎

甘草

天麻

已上各二兩

右為細末煉蜜丸硃砂為衣荊芥湯茶酒任下每服

作十九

生明丸

薄荷葉

川芎

各七錢半

硝砂仁

甘菊華

各半兩

右為細末蜜丸每兩十九

二白丸

海藏法治虛人

禁涼藥

白檀

白芷

人參

川芎

白茯苓

各三錢

防風

三錢

藿香

一兩

桔梗

半兩

細辛

三錢

砂仁

三錢

甘草

三錢半

薄荷葉

一兩

右為細末蜜丸彈子大嚼一九茶清下

枳殼丸

薄荷煎加蒼朮木賊甘菊枳殼荊芥

薄荷湯

治風壅痰涎  
精神不爽

薄荷

一兩  
二錢

甘草

七錢  
半

瓜蒌根

一錢  
二分

荊芥

半兩

砂仁

半兩

鹽

炒四錢  
八分

右細末每服一錢點服

清神散

薄荷葉

兩三

白檀

兩二

人參

兩一

荊芥穗

兩二

甘草

兩二

石膏

飛過  
兩四

細辛根

錢五

羌活

兩一

防風

兩一

右細末每二錢點服

上清散

乾菊

兩一

細辛

錢三

川芎

薄荷

石膏

甘草

防風

羌活

兩各一

荊芥穗

兩一

右細末茶湯調下

香甲散

川芎 青皮 白檀 乾菊 甘草

右為細末茶調下

消風散

主治修製  
并見局方

川芎 羌活 人參 茯苓

荊芥 藿香 防風 甘草

僵蠶炒

蟬殼

各半兩

厚朴製

陳皮

洗炒各  
錢三分

右為細末茶酒任下治沐浴感風寒小兒用乳香荊  
芥湯調下半錢無時

神芎散

治偏正頭痛夾腦風沐浴傷風等證脫著同

甘草

半兩

薄荷

石膏

羌活

獨活

甘菊

荊芥

川芎

各一兩

右細末茶清下如覺頭風兩角痛客主人是也俗呼  
為之太陽穴



又點鼻方

人中白

地龍

去土等分

右為細末羊胆九芥子大用一九新水化開點鼻中立止

化風散

治痰厥偏正頭痛一切傷風

荊芥

甘草

各三兩

石羔

四兩

薄荷

人參

羌活

細辛

防風

白檀

各一兩

右水清茶調下

化風丹

太陽陽  
明合病

防風

半斤

羌活

四兩

白芷

四兩

桂

一兩

麻黃

三兩

川芎

二兩

川烏

炒三兩

藁本

一兩

乾薑

炮一兩

甘草

炙三兩

皂莢

去皮子一兩

右為細末酒浸蒸餅為丸雞頭子大嚼二九茶酒任

下

三陽頭痛

羌活

防風

荊芥

升麻

葛根

石膏

柴胡

川芎

芍藥

細辛

白芷

蔥白

若陰證頭痛只用溫中藥足矣如理中薑附之數

本草註 桃華湯 赤石脂例當在手陽明條下

仲景桃華湯

治傷寒下利不止便膿血治證文並見本經

赤石脂

一斤半一半全用一半米用

乾薑

一兩一粳米半合

右以水七升煮米熟為度去滓每服七合內石脂末方寸七日三愈後止再服不必盡劑

烏頭赤石脂丸

主心痛  
徹背者

烏頭

炮一錢

附子

二分  
炮

赤石脂

乾薑

蜀椒

各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大先服一丸不知稍增

桃華丸亦治婦人崩中漏下下痢膿血桃華湯 純下

血梔子蘘皮湯 治大冷洞利腹滑下赤白腹痛駐

車丸 孫用和治下利又血熱痛蘘皮湯 若尿血

可延胡索散

古方駐車丸

黃連

六

乾薑

二

當歸

二

阿膠

六

右先以醋煮膠令消入前三藥和均衆手丸桐子大  
米飲下三十丸

古方三黃湯後人以為藥皮湯

黃連

一

黃芩

二

黃蘗

三

每服四五錢水一盞半煎至一盞去滓阿膠二斤煎  
化服之痛者加藥子小便不利加茯苓兼久血

利甚效

延胡索散

治尿血

延胡索

一兩

朴硝

三分

右以水煎服之

東垣二紅丸

治小腸下利夜多晝少左手寸脉弦細此從丙至壬  
下補丹田四肢厥冷手足心反溫是為效也

硃砂

半兩

附子

乾薑

赤石脂

各二錢

右細末酒糊九桐子大米湯下少時以物壓之急劑不可緩也

東垣三白丸

乾薑

一兩

白石脂

寒水石

龍骨

燒各半兩

右細末生薑自然汁打糊為丸桐子大米湯下少時以物壓之以上六味藥東垣先生製藥性云白石脂一名白符惡馬目毒公味甘辛澀大腸

東垣調氣方

治赤白痢黃連膠蠟煮散並見本草宋王徽桃飴贊云阿

膠續氣

並見阿膠條下

白石脂

乾薑等分

右百沸湯和麵為丸搜和併手桐子大晒乾米飲下  
三十丸久痢不定加至六十丸 霍亂煎漿水為便

赤石脂散

甘草

五錢

赤石脂

半兩

碓砂仁

四兩

右細末米湯點服

脉弦者加防風

脉洪者加黃



連脉瀋者加當歸 脉遲者加乾薑無論寒熱久病者只加乾薑 一法加龍骨肉豆蔻為豆蔻固腸九千金翼曰治痰飲吐水無時節者其源以飲冷過度遂令脾胃氣弱食不消化飲食入胃則皆變冷水反吐不停赤石脂散主之

赤石脂

搗篩服方寸匕酒飲任服稍稍加至三服七服盡一斤終身不吐冷水又不利補五臟令人肥健有人

痰飲服諸藥不效服此即痊 小兒臍汗出不止兼  
赤腫以白石脂細末熬溫撲臍中日三良

仲景赤石脂禹餘糧湯 此當在手太陽明條下

治不應下而下之泄不止醫與理中之類其泄益甚  
此寒在下焦故以赤石脂禹餘糧湯主之

### 震靈丹

柴府元君南嶽魏夫人方出道藏一名比金丹此丹  
不犯金石飛走有性之藥不僭不燥奪造化冲和之

功大治男子真元虛憊五勞七傷臍腹冷疼肢體酸痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱瘓手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小便淋漓夜多盜汗久瀉久溫酒嚙下腸風便血調百草霜下若休息痢疾烏梅湯下治療湯大槩如此若男子應有走失或泄瀉之後當服者以棗湯下婦人應是虛損或失血之後常服當用

醋湯就中湯使或是服餌不便者當斟酌易之 此藥極固秘元氣無飛走之性服之不致僭燥但是微渴并肥偉人不宜用此常服恐澁滯氣血為雍節之患 若用以治病極有功效不拘此說

桃華丸

赤石脂二

乾薑一

或加烏附

炮

右為細末稀糊為丸桐子大每服三五十九米飲下久痢便紫血者當歸湯下 治丙赤石脂乾薑附子

治庚白石脂附子乾薑

局方赤石脂縮砂仁茯苓甘草散

活人赤石脂丸

赤石脂 乾薑 當歸 黃連

右蜜丸桐子大米湯下二十九

五物厚腸丸

赤石脂 乾薑 附子 吳茱萸 肉豆蔻

固腸丸

赤石脂 乾薑 厚朴 肉菴 砂仁

木香

各半兩

炮製蒸如法

右細末糊丸桐子大生薑米湯下空心

旋覆代赭石例

仲景旋覆代赭石湯

壞證

右傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞭  
勒下痛氣衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿或傷  
寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者

旋覆華

三字

人參

半錢

半夏

半錢

生薑

一錢一字

代赭石

一字

甘草

三字

大棗

一枚

凡言一字力

一分半補正

右㕮咀每服五錢匕水一盞半煎至八分溫服

### 旋覆華湯

治風熱面生赤癰鼻頭赤面紫黑者當刺出血

人參

生薑

甘草

茯苓

旋覆花

去枝葉

黃芩

芍藥

柴胡

枳實

麤炒九味各一錢

右廩末以水四盞慢火煎至二盞半去滓分三服溫

飲又葛根升麻湯加黃芩枳殼

仲景治婦人有三物旋覆華湯 胡洽治痰飲在兩脇  
間脹滿等證旋覆華丸

酒蘊 日華子云山茱萸暖腰膝助水藏除一切風逐

一切氣破癥治酒蘊 汗出見濕乃生痲痺 痺為

瘡癰也 勞汗當風薄為皴皴乃痲痺色赤臍內有

膿血

旋覆華丸



旋覆華

三兩

防風

白芷

乾薑

天麻

天南星

半夏

石膏

川芎

陳皮

各半兩

白附子

半兩

蝎稍

僵蠶

炒各三錢

右細末薑糊丸桐子大薑湯下三五十丸食後服

活人金沸草散

治傷寒中脘有痰令人壯熱頭痛筋急時發寒熱皆

類傷寒

旋覆華

即金沸草

荊芥

前胡

各一兩

甘草

赤茯苓

細辛 半夏

製各三錢

右細末每服三錢水一盞生薑十片棗一枚同煎七

分熱服

局方金沸草散

治風化痰頭項強寒熱身體疼咳嗽滿喘及時行疫

氣壯熱惡風

旋覆花

去梗

荆芥穗

前胡

麻黃

去節各一兩

甘草

炙

赤芍藥

半夏

製各三錢

右ㄙ咀生薑棗煎無時寒邪則汗出風邪則解利

千金翼旋覆華湯

治胸喉中痰結如膠臍下膀胱留飲

旋覆花 細辛 前胡 甘草炙 茯苓

半夏

一兩

生薑

八兩

桂心

四兩

烏頭

五枚去皮熬

右九味切以水九升煮取三升分為三服忌豬羊飴

及生菜等肉加澤瀉尤妙

外臺旋覆華丸

治心頭痰積宿水嘔逆不下食

人參

兩半

甘草

兩半

半夏

錢三

旋覆花

錢三

白朮

兩半

澤瀉

錢三

枳實

兩半

大黃

錢三

右細末生薑糊為丸桐子大生薑湯下無時

范江旋覆白朮茯苓湯

治胸中痰結臍下弦滿又治風水證

旋覆花

兩一

白朮

兩一

陳皮

兩一

茯苓

兩一

桂

兩半

細辛

兩半

附子

炮

半夏

製

當歸

各半

兩

右九味剉每兩分三四服水二盞生薑十片碎同煎  
至七分飲清臨卧食後忌豬羊肉食錫飴生菜滋味  
等物

仲景茯苓飲

治胸中停飲心下宿水吐水氣滿不飲食

茯苓

兩一

白朮

兩一

枳實

錢七

陳皮

兩半

人參

半錢

右剉每服分四服水二盞生薑一錢同煎至七分取

清飲無時

千金翼大五飲丸

胡合方同

主一留飲心下二癖飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈  
上五留飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷渴夕故有  
此疾

遠志

去心

苦參

藜蘆

白朮

烏魚骨

甘遂

大黃

石膏

桔梗

五味子

半夏

炮

紫苑

前胡

芒硝

括萎

桂心

茯苓

貝母

芫花 人參 當歸 茯苓 芍藥 大戟

葶藶 黃芩 已上各一兩 常山 甘草 薯蕷

厚朴 細辛 各三分 巴豆 三十枚去皮心熬

右三十二味細末蜜丸桐子大酒下三九日三稍加之忌肉食生物錫飴冷水等物

海藏五飲湯

人參 陳皮 枳實 旋覆花 白木

茯苓 厚朴 澤瀉 前胡 桂心

芍藥

甘草

猪苓

半夏

已上等分

右呖咀每服分四服水二盞薑十片碎同煎至七分  
水清溫服無時所忌同上及滋味等物

海藏云五飲雖胸膈心下脇間膀胱胃中腸藏府不同  
俱在身以前故入陽明例 五飲湯若因飲酒有飲  
者加葛花縮砂仁

醫壘元戎卷三



欽定四庫全書

子部  
醫壘元戎卷四

詳校官太醫院八品吏目黃發

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官修撰臣吳錫齡

謄錄監生臣范楹

欽定四庫全書

醫壘元戎卷四

元 王好古 撰

陽明證 王朝奉集註譏語例

譏語無次也凡胃實有燥屎則譏語故經曰實則譏語  
虛則鄭聲鄭聲者重語也非輕重之重 譏語有數  
種 有胃實譏語可下證也 有合病者譏語三陽  
合病腹滿身重口不任面垢譏語遺尿白虎湯證

有少陽汗譫語少陽不可發汗只宜小柴胡湯有  
火劫譫語以火劫發汗熱氣入胃故也救速湯有  
汗多亡陽譫語不可下也宜柴胡桂枝湯和其榮衛  
以通津液自愈 有下後譫語傷寒八九日下之胸  
滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側者柴胡加龍  
骨牡蠣湯 有熱入血室譫語陽明病下血譫語者  
熱入血室但頭汗出刺碁門又婦人中風經水適來  
譫語為熱入血室小柴胡湯刺碁門穴有肝乘脾譫

語傷寒腹滿譫語寸口脉浮而緊此肝乘脾也名曰橫刺募門穴有晝則明了夜來譫語此熱入血室無犯胃氣及上二焦不治自愈

仲景調胃承氣湯

大黃

酒漫

芒硝

甘草

右㕮咀水煎服如生薑亦得 調胃承氣湯與四物湯各半一名玉燭散

大承氣湯

治大實大滿

枳實

瘧炒

厚朴

薑製

大黃

酒浸

芒硝

燥

小承氣湯

治太陽陽明實而微滿

枳實

瘧炒

厚朴

製

大黃

生

海藏云調胃承氣湯治實而不滿即正陽陽明是也大承氣湯治大滿大實即太陽陽明是也小承氣湯治實而微滿少陽陽明是也太陽陽明正陽陽明為最高之分故大黃但用酒浸從巔而下之也惟少陽陽明為最下之分處三經之內故黃不用酒浸也非若

二經而高爾若最高之分用最下之藥則耳目昏冒  
咽頰腫痛神癡不清之病有不免矣若最下之分用  
最高之藥則胸中氣消日久不復虛損成勞之病有  
不免矣故仲景三承氣湯各有主治隨經而異即不  
同也 又年老虛人傷寒可下者大承氣湯調胃承  
氣湯皆去硝慢火熬成玄明粉量輕重而下之

煉玄明粉法

朴硝三斤淘淨生好牙者用砂鍋一枚疊寔以炭火

十斤煨之徐徐輕沸可住大火令大沸定以炭蓋之復以炭十五斤緊煨至火盡放令一伏時出鍋中藥放紙上攤勻就地上以盆蓋之一伏時日晒乾入甘草二兩炒微黃剉碎同搗細末量熱輕重沸點二三錢亦可愈正經云味辛甘性冷則治熱病明矣兼味辛又鹹此能潤燥而火堅也非大便燥結脉滑有力及洪大者不宜服却言煖水藏女子服之補血脉有失用藥寒熱之本意經云鹹能勝血豈能補血哉又

方治陰毒一句其言又為錯矣若與硫黃附子及諸陽藥多寡相佐而行則可以治陰中有伏陽也若是陰毒別無伏陽殺人速矣太清伏煉法云硝能制伏陽精解火石之毒則不治陰可知用者審詳也

仲景治襍病三物厚朴湯

厚朴

半兩

枳實

五斤

大黃

四兩

右以水一斗二升煎厚朴枳實取五升大黃四兩再煎取三升溫服一升腹中轉動失氣是也更作一服



下之不效再服易老治消渴在中為順氣散

調胃承氣湯加茅子寒水石為細末煉蜜調服

治疫氣大頭病 加當歸為滌毒散治時氣疣瘡五

發瘡瘍喉閉雷頭 大便軟升麻荷葉湯陽震之象

也 王朝奉舉常器之云有大小便不通氣結一條

有大便不通連服三承氣湯及諸下湯不通者多

是氣結必死矣可針陰會穴在兩陰之間此數有救

得者因此亦有承氣內兼巴豆下而通者不可不知

加郁李仁佳 蜜導薑銳二法在後 氣結會食療

云酒服郁李仁四十九粒更瀉尤良

仲景厚朴七物湯

治腹痛脹滿

厚朴

半斤

大黃

三兩

生薑

五兩

桂

二兩

甘草

三兩

大棗

十兩

大枳實

五枚

右以水一斗煎取四升去滓溫服入合日三服 嘔

者加半夏五合 下痢者加大黃 寒多者加生薑

半斤 楊氏治身體腫滿水氣急卧不得郁李仁一

大合為細末和麪搜作餅子與食入口即大便通利  
氣便差

仲景桃仁承氣湯此下證脉在左手中其熱邪侵盡無  
形之氣則入有形血也 調胃承氣湯加桂桃仁引

而入血也

此當在畜  
血條下

仲景枳實理中湯 煉蜜作丸如桐子大白湯下三十  
丸

深師消飲丸

治宿酒停飲胸滿嘔逆目視眈眈腹中水聲痛不思飲食

白朮

二兩

茯苓

半兩

乾薑

七錢

枳實

七錢炒

右細末蜜丸桐子大空心溫水下三十九日三服半月愈

仲景神奇枳實湯治心下水 易老改二味作丸老年

內傷便軟

梅師治痞方

白朮 澤瀉

生薑煎服與枳朮湯相合四物亦作丸亦可

五苓平胃各半散 生薑調服治心下水 五苓加石

膏寒水石甘草為甘露飲亦治心下水並飲酒水瀉

者生薑調三五錢清濁立分

雄黃銳散

治下部蠟瘡

青箱子

雄黃

苦參

黃連

各三分

薤仁去皮一分

右為散以生艾搗汁和丸如棗核綿裹內下部扁竹  
汁更佳冬無艾只用散綿裹內亦得狐惑與蠶皆為  
蟲證傷寒熱入食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人  
五藏及下部為蠶病其候齒無色舌盡白唇黑有瘡  
忽忽喜眠上唇有瘡食其藏也下唇瘡食其肛也害  
人甚急治蠶桃仁湯黃連犀角湯雄黃銳散

小便不利

仲景猪苓湯

本少陰之劑以其有五苓味三故列陽明條下又治中脘與臍下有水或小便不通

猪苓 茯苓 澤瀉 滑石 阿膠

右每服五錢七水二盞煎至一盞去滓內膠烱盡溫服日三小便不通一切利小便藥不效以其服附子太過消盡肺陰氣所不化師用黃連苓解毒而得通又劉子安病腦疽服內托散後泄不止小便大不通

亦消肺陰之過諸藥不效郭子明輩用五苓木通導之愈祕予用陳皮茯苓生甘艸之類肺氣下行遂通若正用利小便藥其不知本甚矣

靈苑治五腫淋疾 勞淋血淋氣淋石淋至甚者透格散

消石

一兩無泥白者研為細末每服二錢

虛人宜玄明粉

諸淋各依湯使于後

勞倦虛損小便不出小腹急痛菜子末煎湯通後便



須服補虛人參散 血淋小便不出時下血疼痛滿  
急 熱淋小便熱赤色淋瀝不快臍下急痛並用冷  
水調下 氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木通煎湯  
下 石淋莖中痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿  
下沙石令人悶絕將藥末先入銚子內隔紙炒至紙  
焦再研細溫水調下 小便不通小麥湯下 卒患  
諸淋並宜冷調並空心先調使藥散如水即服之更  
以湯使送下服諸藥不效者服此即愈 三焦熱淋

玄明粉主之如石膏尤佳本艸云玄明粉調下劉禹  
錫云偏主石林并五淋難產 冷淋小腸不利莖中  
急痛用石斛葉為末每服三錢水一盞葱白七寸煎  
至六分去粗食前溫服兼治吐血去葱白不用粗冷  
淋熱淋俱用葱白根取其潤而膩也

千金翼治淋黃芩四兩袋貯之水五升煮三升分三服  
小便卒大數非淋也令人瘦以石膏半斤碾細水一  
斗煮五升稍溫飲五合抱朴子 石淋若不通石在

小腸中覓取淋中藥煎呷有神效

抵聖散

治五淋小腸不利莖中痛

檳榔

麩裏煨  
三錢

赤芍藥

一兩

右㕮咀每服三錢水一大盞煎至七分去滓溫服食  
前

千金難產經數日不能生出子死腹中母欲死者瞿麥  
煎濃汁服 亦治竹木刺不得出內者服此瞿麥汁

效

八正散

主治修製  
並見局方

大黃

瞿麥

木通

扁蓄

滑石

梔子

燈艸

甘草

車前子

本証外又治飲食過度前後陰間有瘡諸藥不效宜服此散兼以馬齒莧及青黛為散上之可得痊愈衍

義本草馬  
齒莧條下

瞿麥湯

瞿麥

木通

各一兩

甘草

三分

茯苓

黃芩

猪苓

滑石

扁蓄

通草

各一分

右以咀水煎服

渴發熱加瓜蒌根

小便赤加黃

芩

小便少加車前子

小便澀淋加石葦冬葵子

續隨子

臍下悸動加桂枝石葦

石葦散

石葦

二兩

木通

二兩

滑石

三兩

王不留行

一兩

甘草

一兩

當歸

一兩

白朮

三兩

葵子

三兩

瞿麥

兩二

芍藥

兩一

右為細末湯調服

六一散

滑石

兩六

甘草

兩一

右為細末調服 加當歸并泉右為四血散

治衄血吐血便血 淋者加梔子 莖中痛加蒲黃

水瀉加車前子米飲調

梔子散治五淋見鈴註

車前子散

治水瀉完穀不化三二年久不愈瘦弱氣脫諸藥難

治

車前子

二兩去沙土炒

陳皮

二兩

甘草

一兩

右為細末米飲調下

立效散

瞿麥

一兩

甘草

三分

梔子

半兩

右㕮咀連鬚葱白燈草生薑同煎加連翹四兩桔梗

一兩蜜丸治癭瘤結核

金鑰匙散

治產後大小便不通腹脹等証

滑石

蒲黃

各等分

右為細末酒調下

滑石治婦人過忍小便致胞轉滑石為末葱白湯調下

二錢或三錢

塗臍法治大便不通

甘遂末內臍下白麪糊紙花子

帖仍及臍下近陰處別用甘草湯服之



傷寒類要腹痛滿不得小便及天行病雄黃細末蜜丸  
如棗核大內溺孔中雄黃滅瘢痕黑髮梅師治妊娠  
淋瀝不通水道熱車前子葵根水煎服之

畜血 小便應秘而反自利甚色白

小便自利

腎虛 下焦不收胞有遺溺而頻

楊氏產乳子母二方治婦人妊娠小便不利蕪菁子末  
水調服方寸匕日二蕪菁即蔓菁也

麻仁例 手陽明 太陽經亦可例之太陰津液不行之根

麻仁丸 脾約丸 神功丸 潤腸丸 三脘丸  
五柔丸 三和散 七聖丸 七宣丸

大麻仁丸

風熱燥寒秘用 半硫丸 快活丸

仲景麻仁丸

占方料

治脉實多汗浮乳相搏為胃熱浮澀相搏為便難此

三者皆燥而損濕故曰脾約

麻仁

二升

芍藥

半斤

枳實

半斤

大黃

一斤

厚朴

一尺

杏仁

一斤去皮尖  
熬研作脂

右六味為細末煉蜜丸如桐子大飲下十九日三服

漸加以和為度

活人脾約丸

見料大紙洩  
數則大便難

麻仁

半斤

芍藥

二兩

厚朴

二兩半

大黃

二兩

枳實

二合半

杏仁

一合半

右為細末煉蜜丸桐子飲下十九丸未和益之汗多胃熱便難三者皆燥而乏液故曰脾約脾約者束置而不行也

千金翼并范任張文仲崔氏等方煎與仲景同許學士治年老虛人祕

大麻仁

紫蘇子

各半合

右碾細取汁分二作粥食之後不服藥而愈

局方大麻仁丸

主治脩製並見局方

陳皮

杏仁

木香

潤腸丸

蜜丸

陳皮

血加桃仁

丁香

活人五柔丸

主治脩製  
並見局方

大黃

前胡

半夏

茯苓

浸酒

當歸

芍藥

茯苓

細辛

葶藶

右蜜丸桐子大溫水下二十九

局方中三和湯散

活人神功丸

主治並見局方

麻仁

五兩研

大黃

二兩

人參

半兩

訶子皮

二兩

右細末煉蜜丸桐子大溫水下二十九產後秘者米

飲下

局方七宣丸

主治脩製並見局方

東垣云治在脉則瀉在時則秋

大黃

枳實

木香

訶子皮

柴胡

甘草

桃仁

右煉蜜丸如桐子大米飲下二十九

七聖丸

主治脩製  
並見局方

東垣云治在脉則弦在時則春

檳榔

木香

川芎

郁李仁

羌活

桂心

大黃

右煉蜜丸桐子大溫水下十五丸

活人三脫散

主治脩製  
並見局方

獨活

白朮

陳皮

甘草

木香

大腹皮 紫蘇 木瓜 沉香 川芎

檳榔

右咬咀水煎服

半硫丸

治老弱虛人大便秘者此能利之易簡云此潤劑也

硫黃

半夏  
主治脩製並見局方條下

快活丸  
治中滿虛痞此燥劑也

良薑

乾薑

枳實

陳皮



木香 吳茱萸

右細末麴糊丸桐子大生薑陳皮湯下

海藏已寒丸 此丸不僭上陽生於下

治陰證服四逆輩胸中發燥而渴者或數日大便秘  
小便赤澀服此丸上不燥大小便自利

肉桂 附子 炮 烏頭 炮 良薑 乾薑

芍藥 茴香 各等分

右細末米糊丸桐子大空心溫水下五七十九或八

九十丸食前亦得酒醋糊丸俱得 仲景云跌腸脉  
浮而濇浮則胃氣强濇則小便數浮濇相搏大便則  
難主病人洩數大便亦難 海藏云已寒上五味雖  
熱者芍藥苗香潤劑引而下之陰得陽而化故大小  
自通如得春和之陽冰自消矣

五燥大便秘

東方 其脉弦風燥也 宜瀉風之藥治之

獨活 羌活 防風 茺莖 地黃

柴胡 川芎

南方 其脉洪熱燥也 宜鹹苦之藥治之

黃芩 黃連 大黃 黃蘗 芒硝

西南方 其脉緩土燥也 宜潤溫之藥治之

芍藥 半夏 生薑 烏梅 木瓜

西方 其脉澀血燥也 宜滋血之藥治之

杏仁 麻仁 薤仁 當歸

氣結用木香

檳榔 枳實 陳皮 地黃 郁李仁

北方 其脉遲寒燥也 宜溫熱之藥治之

當歸

肉桂

附子

烏頭

硫黃

良薑

巴豆

仲景吐下之後不大便五六日至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘但發熱譫語者上誠則戲今慌語也屬大承氣湯

枳實

厚朴

大黃

芒硝

右煎如常法一服利者止不必盡劑千金翼並同  
海藏云此治下之後大便澀也循衣摸床者熱之極  
也 自氣而之血上而下之至厥陰之分循衣摸床  
撮空惕而不安擲手揚視手太陰也此下而復上也  
熱而不得出故厥陰復傳于太陰也

地黃黃連湯

治婦人血氣證因大脫血崩漏成前後血因而枯燥  
除熱不循衣撮空摸床閉目不省擲手揚視搖動不

寧錯語失神脉弦浮而虛內燥熱之極也氣麓鼻乾而不潤上下通燥此為難治當服此藥

川芎

錢七

當歸

錢七

梔子

錢三

生地黄

錢七

黃芩

錢二

黃連

錢三

防風

兩二

赤芍藥

錢二

右咬咀每服三錢水二盞煎七分取清飲無時徐徐與之若脉實者加大黃下之 大承氣湯藥也自內而之外者用之血氣合病循衣撮空其證相同 自氣而之血血而復之氣大承氣湯下之也 自血而

之氣氣而復之血地黃黃連主之也二者俱不得大便 東垣先生議論撮空證並見難知 許學生云屬厥陰潔古云屬太陰自下而上也

畜血例

衄血畜血上焦心下手不近畜血中焦且臍腹小腫大痛畜血下焦 畜血上焦或嘔或衄或吐此胸中手不可近也

活人犀角地黃湯 易老云此藥為竄勝

犀角

如無以升麻代之

芍藥

生地黄

牡丹皮

右㕮咀水煎服

熱多者加黃芩

脉大來遲腹不

滿自言滿者無熱也不用黃芩 升麻與犀角性味

主治不同以升麻代之以是知引入陽也治瘡疹大

盛 如元虛人以黃芩芍藥湯主之

活人黃芩芍藥湯

治虛家不能飲食衄血吐血

白芍藥

黃芩

甘草

二藥治傷寒衄血吐血嘔血 一法加生薑黃耆



地黃散

治衄血往來久不愈

生地黃 熟地黃 地骨皮 枸杞子

右等分焙乾為細末每服二錢蜜湯調下無時

犀角地黃湯

治心經邪熱及言語蹇澀發狂心惕恍惚惑忘之疾

生犀角

硃砂

黃連各一錢

白茯苓

生地黃

各一錢半 甘艸

牡丹皮一錢

右為麤末水煎 錢氏亦治傷寒少陽陽明合病

必勝散

治男女血妄行吐血嘔血咯血衄血

人參

當歸

熟地黄

小薊根

川芎

蒲黃

烏梅肉

右等分麤末水煎去滓溫服無時

藥皮湯

治衄血吐血嘔血皆失血虛損形氣不理羸瘦不能食心忪少氣燥渴發熱

生地黄

甘草

黃蘗

白芍藥

各一兩

右又咀用醇酒三升漬之一宿以銅器盛米飲下蒸  
一炊時久漬汁半升服食後時對病增損 肘後用  
熟地黃水酒煎飲清

者石湯

治產後血迷  
不省人事

海浮石

研

黃蘗

末

陳皮

去白

甘草

各等分

右細末陳米飲調下三五錢纔分  
連三服至差更無產後病  
大破血點鷄冠上化水為驗

治室女月露滯澀心煩恍惚

鉛白霜細碾為散每服一錢地黃汁一合調下如無  
汁生地黃煎亦得 治鼻衄鉛白霜末新水調下一  
字

畜血中焦

仲景桃仁承氣湯 此即心下手不可近

易老用此獨治中焦以其內有調胃承氣湯也

桃仁 大黃 甘草 芒硝

右治牙齒等蝕數年不愈當作陽明畜血治之此湯

細末煉蜜丸桐子大服之好飲者多有此疾屢服有效

畜血下焦 三焦畜血脉俱在左手中

張仲景抵當湯

脩製並見本方

水蛭

三十箇

蛭蟲

三十箇

菴仁

二十箇

大黃

三兩

右㕮咀水煎服

許州陳大夫傳張仲景百勞丸方

當歸

炒

乳香

沒藥

各一錢

蛭蟲

十四箇去鉗足

人參錢一

大黃錢四水蛭十四箇炒

苑仁十四箇浸去皮尖

右為細末煉蜜為丸桐子大都作一服可百丸五更

用百澇水下取惡物為度服白粥十日

百澇水勺揚百徧乃仲景

也瀾水

抵當丸與湯四味同但分兩減半搗細水調服 前之

百勞丸乃是此抵當丸內加人參當歸沒藥乳香蜜

丸瀾水下

通經丸乃仲景抵當丸內加穿山甲廣茂苑仁桂蜜丸

婦人傷寒妊娠不可以此丸下當以四物湯大黃各半湯下之在厥陰例四物湯調下

四血散 出診治明理論

治鼻血口血大小便血服時隨病上下食前後

紫蘇 丹參 蒲黃 滑石

右各等分細末調

又方衛州張推官在戲院王公以職醫宿直夜口傳此方治人效者不可勝數尋常凝滯其效尤速任衝不

調經脉閉塞漸成癥瘕

蛭

蛭炒四  
十箇

水蛭

炒四  
十箇

斑猫

去羽  
足炒

當歸

牡牛膝

各二  
兩

紅華

三  
錢

滑石

三  
錢半

右細末每服一錢生桃仁七箇細研入酒調下如血  
未通再服以通為度食前

韓氏微旨方

地黃湯

治病人七八日後兩手沉脉遲細微膚冷臍下滿或



喜或妄或狂或燥大便實而色黑小便自利者此畜  
血證具也若年老及年少氣虛弱者宜此方主之

生地黃

自然汁一升如無生地黃  
只用生乾地黃末一兩

生藕

自然汁半升如無藕以薊刺汁半  
斤如無薊刺汁用薊刺末一兩

藍葉

一握切碎乾  
者末半兩

蚩蟲

三十箇去  
足翅炒黃

菴仁

半兩  
麩炒

大黃

一兩對如  
骰子大

水蛭

十箇

右同一處水三升半同慢火熬及二升以來放冷分  
三服投一服至半日許血未下再投之此地黃湯比

抵當湯丸其實甚輕也如無地黃汁與藕汁計升數  
添水同煎

### 生漆湯

病人七八日後兩手脉沉細而數或關前脉大臍下  
滿或狂走或喜妄或譫語不大便小便自利若病人  
年少氣實即血凝難下恐抵當丸力不能及宜此

生地黃

汁一升如無汁只用  
生薑地黃三兩半

犀角

一兩鎊  
為末

大黃

三兩剉碎  
如骰子大

萸仁

三十箇碎

右作一處用水三升好酒一升慢火熬三升以來傾  
出濾去滓再入鍋投點光生漆一兩半再熬之至二  
升即住淨濾去滓放冷作三服每投服候半日許血  
未下再投一服候血下即止服藥如無生地黃汁更  
添水一升同煎

海藏云畜血可用仲景抵當湯九恐庸醫不知藥性用  
之大過有不止損血之候老弱虛人之禁也故立生  
地黃湯蚘蟲水蛭大黃桃仁內加生地黃乾漆生藕

藍葉之輩也 又云生漆湯一方亦恐其抵當湯丸  
下之大過也是以知乾漆為破血之劑比之抵當湯  
則輕用之通則重用之破稍治食則重也食藥內乾  
漆礪砂非氣實不可用也

活人大黃湯

治陽毒傷寒未解熱結在內恍惚如狂者

菴仁

二十箇  
麩炒黃

官桂

七錢

大黃

一兩

甘草

一兩

芒硝

二錢  
半

木通

一兩

大腹皮

一兩

右呖咀每服四錢水一鍾煎至六分去粗溫服無時  
此方細末煉蜜丸桐子大溫酒下二三十丸治婦人  
經閉或不調 右婦人經閉或不通當在此條下亦  
在少陽例 經云二陽之病發心脾不得隱曲女子  
不月 注云男子少精亦同 若登高墜下重物撞  
打箭鏃刃傷心腹胸中停積鬱血不散以上中下三  
焦部分分之以易老犀角地黄湯桃仁承氣湯抵當  
湯丸之類下之亦有以小便同酒煎治之者更有內

加生地黃當歸煎服者亦有加大黃者 又法虛人  
不禁下之者以四物湯加穿山甲煎服妙亦有同花  
蕊石散以童子小便煎服或酒調下 此藥與寒藥  
正分陰陽不可不辯也若瘀血已去以復元通氣散  
加當歸煎服亦可 又法筋骨損傷用左經丸之類  
或用草烏頭棗肉為丸服之以行諸經者以其內無  
瘀血改用之 藥劑寒熱溫涼不一惟智者能擇之  
而不可偏執也

掌中金丸

治婦人乾血氣

穿山甲

草烏頭

猪牙皂角

各二錢

苦丁香

苦葶藶

川椒

甘草

白附子

巴豆

一錢合用研

右為細末生葱絞汁和丸彈子大每服一九新綿包定內陰中一日即白二日即赤三日即血神效

五通丸

治婦人月水不通臍腹硬痛寒熱盜汗

乾漆炒

紅花

丁香

牡丹皮

當歸

官桂

廣茂

各半兩

右醋丸桐子大每服三十丸當歸酒下米飲亦得  
女子不月帝曰何以知其婦人之懷子也岐伯曰身  
有病而無邪脉若身有病而脉亦病尺亦不至是經  
不調也胞閉亦同

桃華散

治室女經閉不通五心煩熱

紅花

當歸

牡牛膝

菝葜

皮炒去

右等分每服三錢溫酒調下



通經丸

治室女經不通  
或疼痛或瘕

卷四

桂心

大黃

青皮

乾薑

川椒

川烏頭

炮

廣茂

乾漆

炒

當歸

菴仁

右為細末先以四錢米醋熬成膏和餘末七錢九桐子大空心醋湯下加至三十九丸溫酒亦得

結胸例

大小陷胸湯丸

主治並見  
仲景本方

仲景大陷胸湯

大黃

芒硝

甘遂

右先煮大黃至八分去滓下硝一沸止後調甘遂末一字溫服利止後服

小陷腸湯

大黃

黃連

栝蒌實

右水二盞先煮栝蒌實至一盞半下諸藥煎取八分溫服未利再服下黃涎

大陷胸湯

大黃

葶藶

芒硝

杏仁

右上二味為末下二味研和末如彈子大每服一丸  
入甘遂末半字白蜜少許水二盞半煎至一盞頓服  
一宿未利再服

活人大陷胸湯

主治並  
見本經

桂枝

甘草

人參

各三  
兩

大棗

三  
枚

括萋實

一枚去皮用  
四分之一

右剉麻豆大水二盞煎至八分去粗溫服胸中無堅  
物者勿服

治結胸聖餅子炙法

黃連

七兩

巴豆

十四枚通去皮用

右為細末唾和成膏安填入臍中以艾炷炙其上候透方止神效 許學士治結胸內藥臍中並見前活法

本艸治結胸蟻螯一箇碾生絹絞汁并花水調下後見少陽蠶蟲丸條

王朝奉云大小陷胸湯丸不效宜增損理中丸

乾薑

炮半兩

人參

括萎

甘草

牡蠣

各三兩

枳實

炒二十箇

黃芩

去皮枯一兩

白朮

二兩

右細末煉蜜丸彈子大白湯半盞煎服不歇復與之  
不過五六胸中豁然矣用藥神速未嘗見也本方渴  
加瓜蒌根不渴者除之汗者加牡蠣不汗者勿用

宿食停留結胸具見微旨方此非若已病飲水過多成  
水結胸也韓氏茯苓陷胸湯主之

婦人血結胸 海蛤散在少陰仲景大蜜丸後活人治

婦人傷寒血結胸膈而痛不可撫近者宜

海蛤散

治婦人血結胸法當刺悤門仲景無藥此方疑非仲景之言然而頗有理姑存之

海蛤

一兩

滑石

一兩

芒硝

半兩

甘草

右為細末每服二錢雞子清調下小腸通利則胸膈血散膈中血裏則小腸壅滯胸中血不流宜此方若便利血行宜桂枝紅花湯治之

仲景文蛤散

治病在陽應以汗解之反以冷水嚙之若灌之其熱蔽  
卻不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴宜文  
蛤散若不差者服五苓散寒實結胸無熱證者與三物  
白散龐安常云小陷胸丸非也文蛤一兩為散沸湯和  
服方寸匕

外臺治五蒸五方內有芒硝苦參蜜及青箱艾葉大黃  
石膏生地黃之類皆不出湯液用者各隨經虛實內外

淺深治之盡矣

古今錄驗解五蒸湯

甘草

兩一

茯苓

兩二

人參

兩二

乾地黄

兩三

竹葉

把二

葛根

兩三

知母

兩二

黃芩

兩二

粳米

合一

石膏

碎二兩

右十味以水九升煮取二升半分為三服亦可以水

三升煮小麥一升乃煮藥忌海藻菰菜蘆薹米醋茺

汪同 一方無甘艸茯苓人參竹葉



又五蒸丸

烏梅

鷄骨

紫苑

芍藥

大黃

黃芩

細辛

各五分

知母

四分

礬石

炒分

括蕒

桂心

各三分

右十一味細末蜜和丸桐子大飲服十九日二忌生

薑生菜一方無桂心自汗者加地骨皮無汗者加

柴胡根

五蒸

實熱

黃連

黃芩

黃蘗

大黃

虛熱

烏梅

秦艽

柴胡

氣也

青蒿

鱉甲

蛤蚧

牡丹皮

小麥

血也

肺

乾鼻

烏梅

紫苑

天門冬

麥門冬

皮

唾舌白

桑白皮

石膏

膚

昏昧

牡丹皮

氣

偏身氣熱

人參

黃芩

梔子

大腸

鼻口孔  
乾痛

芒硝

大黃

脉

唾白浪語經絡  
血脉緩急不調

當歸

生地黃

心

舌乾

黃連

生地黃

血

髮焦

地黃

當歸

桂心

童子小便

小腸

下唇焦

木通

赤茯苓

生地黃

脾

唇焦

芍藥

木瓜

苦參

肉

食無味而嘔

芍藥

胃

舌下痛

石膏

粳米

大黃

芒硝 葛根

肝 眼黑

前胡

川芎

當歸

筋 中焦

川芎

當歸

膽 眼白 失色

柴胡

栝蒌

三焦 作寒 作熱

石膏

竹葉

腎 兩耳 焦

石膏

知母

生地黃

寒水石

腦 頭眩 問

羌活

地黃

防風

髓

髓沸骨中焦

當歸

地黃

天門冬

骨

齒黑腰痛足逆變疳食藏

鯢甲

當歸

地骨

牡丹皮生地黃

肉

支細跌腫藏府俱熱

石膏

黃蘗

胞

小便黃赤

生地黃

澤瀉

茯苓

沉香滑石

膀胱

左耳焦

澤瀉

茯苓

滑石

凡此諸蒸皆因熱病後食肉油膩行房飲酒犯之而成  
久蒸不得除變成疳病即死矣 右二方數條當在  
前外臺五蒸議論條下

仲景蜜導煎法外又有猪膽和醋法灌穀道中崔氏依  
仲景法亦用猪膽汁灌下部中立通 又有薑兌作  
銳法削生薑如小指長二寸鹽塗之內下部中立通  
虛人不可下者宜用以其先結後澹也 崔氏云若  
胃有燥屎令人錯語宜承氣湯 若大便利錯語宜  
黃連解毒湯 又云承氣湯舊有芒硝以其有毒故  
去之用之甚安如服湯不得利者用薑兌法用此又  
不得利者始可用加芒硝湯下之 海藏云古人詳

細不妄用如此今人好用涼藥過泄之者宜觀此為  
鑒戒也以上諸蒸或臟病或腑病或臟腑俱病脉絡  
氣血交經相連用藥皆當合而用之君臣佐使上下  
奇偶表裏虛實逆從通塞汗下吐補俱在其中矣

醫壘元戎卷四